




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 15 12 2020



Nhèu ventada

Limit deth
bòscEsguitlament
de nhèu

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Enes pales erbosees arribentes se demore de manèra isolada lauegi naturaus.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar especiaument per subrecargas fòrtes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Enes pales erbosees arribentes, pendent era tarde son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principaument apròp des crestes, en canaus e conques. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. En còtes baishes e mejanas es celhs son superiors ara mejana sasoèra. Era part basau deth mantèth ei umida. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.


Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 15 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Pendent era tarde non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti.

Precaucion sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb eth vent de moderat a fòrt, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principaument apròp des crestes, en canaus e conques. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.