




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDissabte 26 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Per dessus deth limit deth bòsc, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida addicionaument. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, especiaument enes sòns marges. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de dijaus a queigut un shinhau de nhèu. Damb eth vent fòrt de direccion variabla , per dessus deth limit deth bòsc s'an format majoritàriament de mida petita. Enquiara net aguestes darrères aumentaràn de mida addicionaument. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfície trenda deth mantèth de nhèu vielh.

Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.


En còtes baishes e mejanes non i a nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 26 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Per dessus deth limit deth bòsc, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida addicionaument. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions, especialment enes sòns marges. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de dijaus an queigut en quauqui sectors enquia 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , per dessus deth limit deth bòsc s'an format majoritàriament de mida petita. Enquiara net aguestes darrères aumentaràn de mida addicionaument. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfícia trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères.

Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en zònes de nauta montanha.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.