



## Matin




## Après-midi





## Degré de danger 3 - Marqué


**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le Samedi 06 02 2021



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Avalanches de glissement  
 (Avalanches de fond)



**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le Samedi 06 02 2021



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Avalanches mouillées  
 (Neige humide)



**En cours de journée, des avalanches de neige mouillée et de glissement sont possibles. Neige ancienne fragile à surveiller.**

Le danger d'avalanches augmente un peu en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches de neige meuble mouillée de plus en plus nombreuses sont à attendre. Ceci sur les pentes extrêmement raides ensoleillées. Des avalanches peuvent aussi entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux et atteindre une taille dangereuse. En outre il existe un danger prononcé d'avalanches de glissement. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver isolés. Prudence à toutes les expositions au-dessus d'environ 1900 m, notamment sur les pentes très raides comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés.

En outre les accumulations de neige soufflée fraîches sont partiellement fragiles en haute montagne, notamment à proximité des crêtes sur les pentes à l'ombre.

Une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche est nécessaire.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

md.7: zones avec peu de neige à côté des zones enneigées

Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification croissante du manteau neigeux. Le rayonnement nocturne est réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et



se ramollit en cours de journée. Ceci à toutes les expositions à basse et moyenne altitude comme sur les pentes très raides ensoleillées aussi en altitude.

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes. Ceci surtout au-dessus d'environ 1900 m.

La partie inférieure du manteau neigeux est largement stable.

Les accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles en haute montagne. Ceci sur les pentes à l'ombre.


## Tendance

Le danger d'avalanches augmente en cours de journée.



## Degré de danger 3 - Marqué


**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le Samedi 06 02 2021



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Avalanches de glissement  
 (Avalanches de fond)



**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 le Samedi 06 02 2021



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Avalanches mouillées  
 (Neige humide)



Des avalanches de neige mouillée et de glissement de plus en plus nombreuses sont possibles avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire. Des avalanches peuvent se déclencher dans la neige ancienne fragile par endroits et atteindre une grande taille.

Le danger d'avalanches augmente un peu en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches de neige meuble mouillée de plus en plus nombreuses sont à attendre. Ceci sur les pentes extrêmement raides ensoleillées. Des avalanches peuvent aussi entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux et atteindre une taille dangereuse.

Il existe un danger à ne pas sous-estimer d'avalanches de glissement. Ceci surtout à l'ouest et au nord-ouest. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Des avalanches sèches peuvent aussi être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver dans la neige ancienne fragile. Ceci au-dessus d'environ 1900 m, notamment dans les endroits plutôt faiblement enneigés comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés. Entre environ 1900 et 2300 m les endroits dangereux sont plus fréquents et le danger un peu plus élevé. Des avalanches peuvent entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux et atteindre une taille dangereuse. Des déclenchements à distance sont possibles. Expérience et retenue sont nécessaires. Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se sont formées surtout à proximité des sommets.

## Manteau neigeux



**Modèles de danger**

md.7: zones avec peu de neige à coté des zones enneigées

md.10: situation de printemps

Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification croissante du manteau neigeux, notamment à basse et moyenne altitude comme sur les pentes très raides ensoleillées. Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes, notamment entre environ 1900 et 2300 m à toutes les expositions. Les départs d'avalanches et les tests de stabilité confirment la structure fragile du manteau neigeux.

## Tendance

Le danger d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente en cours de journée.

## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Samedi 06 02 2021



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



1900m



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2400m

Des coulées humides en cours de journée en général de petite taille sont possibles avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des avalanches humides isolées sont possibles, mais en général uniquement de petite taille. Prudence surtout sur les pentes extrêmement raides ensoleillées.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés, surtout au-dessus d'environ 1900 m.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.7: zones avec peu de neige à côté des zones enneigées

md.10: situation de printemps

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes. Ceci surtout au-dessus d'environ 1900 m. Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification progressive du manteau neigeux. À moyenne altitude le manteau neigeux est humide. À basse altitude le manteau neigeux est totalement mouillé.

## Tendance

Augmentation du danger d'avalanches humides et mouillées.