



Grad de perilh 3 - Mercat




Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 06 02 2021



Nhèu umida



2400m



Esguitlament
de nhèu



2400m

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perilh mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, en tot moment son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben fòrça grani. Tanben enes pales ombrères apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , en fòrça endrets s'an format plaques de vent a viatges inestables. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanas: Aguestes condicions meteorologiques facilitaràn a compdar deth maitin un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 2000 m aproximativament.


Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 06 02 2021



Nhèu umida



2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perilh mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Damb eth vent fòrt , en còtes nautes s'an format plaques de vent a viatges inestables.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessús des 1900 m aproximativament.

Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessús des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especialment en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanas: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendéncia

Leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida augmentarà.