





AM




PM






Grad de perill 3 - Mercat




Tendència: perill de lauegi constant
enDissabte 06 02 2021



Nhèu umida



Esguïtament de nèu



Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perill mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtament basau.

A conseqüència der aument dera temperatura, en tot moment son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben fòrça grani. Tanben enes pales ombrères apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , en fòrça endrets s'an format plaques de vent a viatges inestables. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primauerau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Aguestes condicions meteorologiques facilitaràn a compdar deth maitin un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 2000 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Tendència

Leugèr afebliment deth perill de lauegi sequi. Eth perill de lauegi d'esguïtament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant


enDissabte 06 02 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



Tanben pendent era net son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perillh de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau an causat per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Especiaument enes pales arribentes soleienques e en còtes baixes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Principaument per dessus des 1900 m aproximativament.

Es plaques de vent diuèrses quan hè mau temps practicament non se detècten.

Tendència

Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
enDissabte 06 02 2021



Nhèu umida



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perill mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Damb eth vent fòrt, en còtes nautes s'an format plaques de vent a viatges inestables.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mèns pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perill de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament.

Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.




Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendència

Leugèr afebliment deth perill de lauegi sequi. Eth perill de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà.



Grad de perill 3 - Mercat

AM:**Tendència: perill de lauegi constant**
enDissabte 06 02 2021 →Coches fèbles
persistentesEsguitlament
de nhèu**PM:****Tendència: perill de lauegi constant**
enDissabte 06 02 2021 →Coches fèbles
persistentes

Nhèu umida



En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Eth problèma de coches febles persistents requerís atencion.

Eth perill de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

Ath delà i a un perill substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vièlha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recents son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Sustot apròp des crestes enes pales ombrères.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es condicions de temps primaueru causaràn ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ath long deth dia. Açò s'aplique en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes encara en altitud.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique



especialment per dessús des 1900 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.


Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en zònes de nauta montanha. Açò s'aplique enes pales ombrères.

Tendència



Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia.




Grad de perill 3 - Mercat

AM:**Tendència: perill de lauegi constant**

enDissabte 06 02 2021 →

**PM:****Tendència: perill de lauegi constant**

enDissabte 06 02 2021 →



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtament basau. En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Eth perill de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

I a un perill apreciable de lauegi d'esguïtament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airus damb henerècles d'esguïtament basau.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 1900 e es 2300 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiència e prudència.

Sustot apròp des soms s'an format plaques de vent a viatges inestables.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaverau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.




Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 1900 e es 2300 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ath long deth dia.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 06 02 2021



Coches fèbles
persistentes



1900m



Nhèu umida



2400m

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia aumens de mida petita.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Sustot per dessus des 1900 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 1900 m aproximativament. Es condicions de temps primaueru causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

Tendència

Aument deth perih de lauegi umits e fòrça umits.