




AM




PM







Grau de Perill 3 - Marcat

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant**
enDiumenge 07 02 2021

Capa feble persistent




Lliscaments

**PM:****Tendència: Perill d'allaus constant**
enDiumenge 07 02 2021


Lliscaments



Neu humida



Capa feble persistent



Amb la pujada de les temperatures diürnes i la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida i de lliscament basal. En algun indret les allaus poden implicar el mantell de neu vella feble i arribar a mida gran.

El perill d'allaus augmentarà ràpidament al llarg del dia. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió. Això s'aplica als vessants assolellats extremadament inclinats. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans.

Hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir. Això s'aplica especialment als sectors de l'oest i del nord-oest. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.

També, les allaus seques poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica per sobre dels 2000 m aproximadament. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Entre els 2000 i els 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és lleugerament més gran. Les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Són possibles desencadenaments a distància. Són necessàries experiència i prudència.

Sobretot prop dels cims s'han format plaques de vent de vegades inestables.

Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: lliscaments

pp.10: escenari de primavera

Les condicions de temps primaveral causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. Sobretot en cotes baixes i mitges, i també als vessants assolellats molt inclinats.


A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2400 m aproximadament en totes les orientacions. Els desencadenaments d'allaus i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència

El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà al llarg del dia.

Grau de Perill 3 - Marcat


AM:



Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 07 02 2021



Capa feble persistent




Lliscaments




PM:




Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 07 02 2021



Lliscaments



Neu humida



Capa feble persistent



En el transcurs de la jornada són possibles allaus de fusió i de lliscament basal. El problema de capes febles persistents requereix atenció.

El perill d'allaus augmentarà ràpidament al llarg del dia. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió. Això s'aplica als vessants assolats extremadament inclinats. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans.

A més hi ha un perill substancial d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.

Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Precaució a totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut.

A més a les zones d'alta muntanya les plaques de vent més recents són en alguns casos proclius al desencadenament. Sobretot prop de les carenes als vessants obacs.

És necessària una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: Lliscaments

pp.10: escenari de primavera

Les condicions de temps primaveral causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu s'ha regelat, però només ha format una



fina crosta i s'estovarà al llarg del dia. Això s'aplica a totes les orientacions en cotes baixes i mitges, i també als vessants assolellats molt inclinats encara en altitud.

A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Això s'aplica especialment per sobre dels 2000 m aproximadament.

La part basal del mantell és majoritàriament estable.

Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves a les zones d'alta muntanya.

Això s'aplica als vessants obacs.

Tendència

El perill d'allaus augmentarà al llarg del dia.



Grau de Perill 3 - Marcat

AM:**Tendència: Perill d'allaus constant**
enDiumenge 07 02 2021

Capa feble persistent




2000m



Neu humida



2400m

PM:**Tendència: Perill d'allaus constant**
enDiumenge 07 02 2021

Lliscaments




2400m



Neu humida



2400m



Capa feble persistent



2000m

Amb la pujada de les temperatures diürnes i la radiació solar, són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal de mida petita a mitjana.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada allaus de neu humida, fins i tot de mida mitjana. Precaució sobretot als vessants assolellats extremadament inclinats.

Sobretot per sobre dels 2000 m aproximadament, les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

pp.10: escenari de primavera

A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Això s'aplica especialment per sobre dels 2000 m aproximadament. Les condicions de temps primaveral causaran una gradual humidificació del mantell de neu. El mantell de neu és humit en cotes mitges. El mantell de neu és molt humit en cotes baixes.

Tendència

Augment del perill d'allaus humides i molt humides.