






Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 18 03 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Eth vent fòrt transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion enes pales arribentes per dessus deth limit deth bòsc en totes es orientacions. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions son possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes e enes pales damb plaques de vent.

Ath delà son possibles quauqu'uns lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana. Sustot en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Es acumulacions de nhèu ventada demoren inestables.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 18 03 2021



Nhèu ventada



Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son inestables. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana. En altitud e en zònes aupines es plaques de vent son mès granes.

A conseqüència dera radiacion solara, son possibles lauegi naturaus, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst s'an acumulat 10 cm de nhèu. Pòca nhèu recenta enes sectors deth sud e deth sud-èst. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Enes sectors exposadi ara balaguèra e apròp des crestes eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable a petita escala. Es plaques de vent friables des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Ena rèsta d'orientacions eth mantèth de nhèu ei mens favorable ath desencadenament. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Es acumulacions de nhèu ventada demoren inestables.