


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 19 04 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Especiaument per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manera isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perih

Nauas e vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar de manera isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes orientacions nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben apròp des crestes de totes es orientacions en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Especiaument enes pales arribentes soleienques per dessus des 2200 m aproximativament: De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.

Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.


Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei ja fòrça bon.

Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Escàs afebliment deth perih de lauegi sequi. Açò s'aplique especiaument en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →


enDeluns 19 04 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Especiaument per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perill

Nauas e vielhes acumulacions de nhèu ventada son en casi isoladi fòrça granes mès se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes orientacions nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Tanben apròp des crestes de totes es orientacions en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Especiaument enes pales arribentes soleienques per dessus des 2200 m aproximativament: De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada.

Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

Eth ligam entre es diüerses plaques de vent ei ja fòrça bon.



Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans.

Tendència

Escàs afebliment deth perill de lauegi sequi. Açò s'aplique especiaument en còtes nautas e zònes de nauta montanha.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
enDeluns 19 04 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit deth
bòsc



Nhèu
ventada



2000m

Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh. Aguestes darrères an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perill de lauegi. Enes pales soleienques fòrça arribentes, a compdar dera maitiada son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Eth mantèth de nhèu vielh ei ben consolidat de manèra generalizada. Era nhèu recenta dera darrèra setmana e tanben es plaques de vent plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei ja fòrça bon.

Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atendirà mès d'ora qu'eth dia abans.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Es condicions de temps causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.