





Grad de perih 3 - Mercat

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 03 05 2021



Nhèu ventada

Limit deth
bòscCoches
fèbles
persistentes

2600m



Nhèu umida



2000m

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable. En zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

A conseqüència dera ploja, eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament. Especiaument enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2000 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionalement exposar-se ath perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud-oèst, en zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiva der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.3: ploja

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors enquiath matin queirà ploja enquia en còtes nautes. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent deth sud-oèst de moderat a fòrt plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Açò s'aplique principalement per dessús des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.

En còtes baixes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes




e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

Tendéncia

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perilh de lauegi. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.




Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 03 05 2021



Nhèu umida




2400m



Nhèu ventada



2400m



Coches fèbles persistentes



2600m

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable. En zònes de nauta montanha: Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament. Especiaument enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficials deth mantèth. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud-oèst, en zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.3: ploja

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors enquiath matin queirà ploja enquia en còtes naves. Era ploja causarà ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent deth sud-oèst de moderat a fòrt plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Açò s'aplique principaument per dessus des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.



En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

Tendéncia

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perilh de lauegi. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.