



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 11 03 2022

Es condicions entàs excursions son favorables.

Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Sustot enes terren pòc freqüentades. Es pales ombrères extrèmament arribents an d'èster traussades d'un en un.

Ath delà eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà a compdar de meddia. Especiaument enes pales soleienques arribentes, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita a mejana. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets.

Enes pales ombrères: Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Sustot per dessus des 2400 m aproximativament. Era part superiora deth mantèth ei trenda, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi.

Enes pales arribentes soleienques, per dejós des 2600 m aproximativament: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Tendència

Perilh feble (1) de lauegi. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits ath long deth dia aumentarà leugèrament.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 11 03 2022

Es condicions entàs excursions son favorables.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Sustot enes pales soleienques arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets.

Enes pales arribentes soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth ei trena, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi.

Tendència

Perilh feble (1) de lauegi. Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita a mejana.