





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Vent e nhèu recenta locaument: Acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt deth nòrd, a compdar dera maitiada, se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent mès recentes se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques per dessus des 2000 m aproximativament. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti e se tròben en totes es orientacions.

Enquiath maitin, son probables sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida. Sustot enes sectors afectadi pera ploja. Damb eth heiredament, eth perilh de lauegi fòrça umits baisharà rapidament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Locaument enquiara maitiada queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument encara mès. Ploges en quauqui sectors enquiath dejós des 2000 m. Ací eth mantèth de nhèu ei umit. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficial.


En ua zòna vasta a compdar dera matiada eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd de fòrt a plan fòrt se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Damb es baishes temperatures, eth cèu parciaument embromat e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, eth dimenge eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 10 04 2022

Encara possibles de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu umida.

Es lauegi umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes. En fòrça endrets en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Sustot en còtes baishes e mejanes.

Celh de nhèu

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Locaument enquiath matin queirà un shinhau de nhèu. Ploges en quauqui sectors. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficial.

En ua zòna vasta a compdar dera matiada eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era pòca nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd de fòrta intensitat se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Tendència

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perih de lauegi fòrça umits.