



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 11 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Eres aurien d'èster avalorades damb prudècia sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mida mejana.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Açò s'aplique especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge sustot en altitud se formaràn plaques de vent addicionaus. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada.

En còtes baishes e mejanes:

Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.


Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua rapida estabilizacion des plaques de vent.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu sense coesion petites e mejanes naturaus disminuirà.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 11 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies son en part encara inestables. Eres aurien d'èster avalorades damb prudècia sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Eth dimenge sustot en altitud se formaràn plaques de vent adicionaus. Eres son principalement mès a lèu petites.

Damb eth heiredament, eth dissabte eth mantèth de nhèu s'a consolidat.

Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua estabilizacion des plaques de vent. Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi fòrça umits disminuirà.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 11 04 2022

Es condicions de lauegi son majoritàriament favorables. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, s'an format plaques de vent de mida mès a lèu petita. Eth dimenge espciaument apròp des soms se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben espciaument apròp de crestes, en canaus e conques. Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar sustot en pales fòrça dretes.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enquiath meddia queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà, apròp des soms, de moderat a fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes: Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida e fòrça umida.