Matin

Après-midi



Danger Level 3 - onsiderable



Distinct ea layers in the old snopac are treacherous.

Distinct ea layers in the old snopac can still be released by individual inter sport participants in particular on est, north and east facing slopes. This applies in particular beteen approximately 1600 and 200 m, in isolated cases also on steep sunny slopes at elevated altitudes. Caution is to be exercised in particular at transitions from a shallo to a deep snopac, hen entering gullies and bols for example. Avalanches can reach dangerously large size. emotely triggered avalanches are possible.
The small ind slabs are in some cases prone to triggering at elevated altitudes, especially adjacent to ridgelines on very steep shady slopes.
n addition a latent danger of gliding avalanches exists. This applies on steep grassy slopes belo approximately 2400 m.

Snopac

Danger patterns dp.: sno-poor zones in sno-rich surrounding dp.2: gliding sno

aceted ea layers exist in the centre of the snopac, especially on est, north and east facing slopes beteen approximately 1600 and 200 m, in isolated cases also on sunny slopes at elevated altitudes. humpfing sounds and the formation of shooting cracs hen stepping on the snopac serve as an alarm indicating the danger.
The solar radiation ill give rise as the day progresses to increasing moistening of the snopac in particular on steep southeast, south and est facing slopes.

Tendency

A sometimes treacherous avalanche situation ill persist. Distinct ea layers in the old snopac

Degré de danger 2 - Limité

AM:

Tendance: danger d'avalanche constant
leMercredi 13 04 2022

PM:

2800m

Tendance: danger d'avalanche constant
leMercredi 13 04 2022

2800m

Avalanches mouillées (Neige humide)

En cours de journée danger d'avalanches mouillées limité.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions assez favorables. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m ainsi que près des crêtes à toutes les expositions. Des anciennes accumulations de neige soufflée devraient être contournées en terrain très raide dans la mesure du possible.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente. Des avalanches mouillées de petite et rarement moyenne taille sont possibles. Ceci surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au sud et à l'est en dessous d'environ 2800 m comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps | md.6: froid, neige légère et vent

Les accumulations de neige soufflée se sont assez bien liées avec la neige ancienne. Elles sont encore de manière isolée fragiles en altitude.

Mardi il fait très doux. La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit dès la matinée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée un ramollissement net du manteau neigeux. Ceci sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2600 m comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2200 m.
On observe moins de neige que d'habitude.

Tendance

> Les conditions sont printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Degré de danger 1 - Faible

AM:

Tendance: danger d'avalanche constant
leMercredi 13 04 2022

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant
leMercredi 13 04 2022

Avalanches mouillées (Neige humide)

Les conditions sont printanières.

On ne trouve plus que peu de neige. Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des coulées humides sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps

À toutes les expositions ainsi qu'à toutes les altitudes on ne trouve plus que peu de neige.
La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit plus vite que la veille.
Les accumulations de neige soufflée petites de la fin de semaine se sont bien liées avec la neige ancienne.

Tendance

Les conditions sont printanières. Augmentation légère du danger de coulées humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.