




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 27 02 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Sustot per dessús deth limit deth bòsc son possibles lauegi. Aço se da en totes es orientacions. Aguestes pòden soent desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosí aumentarà. Aguestes demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Eth perilh de lauegi ei leugèrament superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher. Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn en periòde enquiath dimenge en una àrea extensa de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccions variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus, especialment per dessús deth limit deth bòsc.



Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Tendéncia

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 27 02 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues aurien d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 1600 m aproximativament. Aguestes darrères son en quauqui casi extenses e se pòden desencadenar damb facilitat. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth perilh de lauegi ei leugèrament superior enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

A compdar de dissabte an queigut de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn en periòde enquiat dimenge enquia 15 cm de nhèu en totes es còtes. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direcció variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent addicionaus, especialment per dessús des 1600 m aproximativament.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Tendència

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 27 02 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.
Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent recentes e antigues aurien d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un solet montanhaire, sustot ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes e pòc freqüentades orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti endrets son rari mès de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquiat dimenge de 5 a 15 cm de nhèu, especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccio variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui metres per dessús deth limit deth bòsc.


Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

Tendéncia

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Es condicions deth temps provocaràn un lent cambi entà milhors condicions.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 27 02 2023



Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguilar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot en còtes baishes e mejanes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bosc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Es condicions entàs excursions demoren generaument favorables.