




Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 02 03 2023



Plaques de vent

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Coches fèbles persistentes

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent recentes e antigues aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es plaques de vent son mès granes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben de manèra fòrça isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères.


Sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables, sustot entre es 2200 e es 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth ligam damb era nhèu vielha des diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 02 03 2023



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perih.

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada des darrèri dies representen era hònt principau de perih. Es lauegi pòden encara desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion enes pales arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2200 m aproximativament. Acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Damb era nhèu recenta e eth vent de direccion variabla , en totes es orientacions s'an format plaques de vent abondiues, especiaument per dessus deth limit deth bòsc. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

Tendència

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud. Es condicions deth temps provocaràn un refortiment des plaques de vent.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDijaus 02 03 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, sustot en còtes baishes e mejanes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu.

Locaument a compdar dera tarde queirà pòca nhèu.

Tendència

Es condicions entàs excursions demoren generalement favorables.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 02 03 2023

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. Es plaques de vent s'ei possible s'aurien d'evitar sustot en pales ombrères apròp des crestes. Agustes darrères son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana.

Ath delà, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla, en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes.

Tendència

Es condicions deth temps provocaràn un refortiment des plaques de vent.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 02 03 2023

Predominen en generau condicions favorables.

Un solet excursionista pòt de manèra isolada e pro desencadenar lauegi. Es endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Aguesti son fòrça rari mès de mau reconéisher.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en còtes baishes e mejanes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères per dessus des 2500 m aproximativament e enes pales soleienques en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets peth moment i a pòca nhèu. Sustot enes pales soleienques per dejós deth limit deth bòsc en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Locaument a compdar dera tarde queirà pòca nhèu.

Tendència

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Es condicions entàs excursions demoren generauement favorables.