



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. A conseqüència dera radiacion solara, aument deth perih de lauegi.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessus des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà. Damb era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus disminuirà. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

## Tendència



Dimars: A consequència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perilh de lauegi.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminuci3n deth perih de lauegi**  
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atenci3n. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères f3rça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales f3rça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vieha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales p3c freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi f3rça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques per dej3s des 2600 m aproximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Aguestes condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth perih de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu f3rça umida aumentarà leugèrament.

## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →

enDimars 21 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada, açò se da tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament, sustot enes pales pòc freqüentades orientades a nòrd-èst e èst.

Net: Damb era ploja, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida petita per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales ombrères.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà leugèrament. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enes següentes ores queirà ploja enquiàs 2000 m. Queirà locaument enquia 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia, especiaument en còtes mejanes. I a pòca nhèu en còtes baishes.

### Tendència

Dimars: A conseqüència der augment dera temperatura diürna, escàs augment deth perilh de lauegi.


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendéncia: perih de lauegi constant** →  
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
Frecuèncià: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



**Limit deth bòsc**

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**  
Frecuèncià: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. En cors dera jornada son possibles purgues isolades.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-oèst, eth dimèrcles, sustot apròp des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges inestables. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. En zònes de transicion de celh prim a grossut era probabilitat de desencadenament ei major. Es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha de manèra isolada ja per subrecargues febles. Açò se da esepciaument enes pales ombrères fòrça arribentes. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables de manèra isolada purgues de nhèu umida ath long deth dia aumens de mida petita. Açò se da esepciaument enes pales soleienques, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

Eth ligam damb era nhèu vielha des plaques de vent ei locaument encara desfavorable. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua crosta dura.



Espciaument enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles isolades. Açò se da per dessus des 2200 m aproximativament.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà en particular enes pales soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Agustes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Eth dimars serà soleienc A conseqüèncià der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perih de lauegi.

## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →  
enDimars 21 03 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)  
Frecuècia: [Quauqui](#)  
Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion enes pales ombrères pòc frequèntades.

Ath delà en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès antigues pòden de manèra isolada encara desencadenar-se.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautes e nauta montanha.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Es condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Damb er augment dera temperatura diurna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 21 03 2023

Predominen majoritariament condicions de lauegi favorables.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben sustot en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères en còtes nautes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes. Locaument queirà un shinhau de ploja. Queirà nhèu per dessus des 2000 m aproximativament.

### Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 21 03 2023

Damb era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida aumentarà leugèrament. Eth problèma de nhèu ventada vieilha ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'aurien d'evitar en particular en pales fòrça inclinades, tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales arribentes en quauqui endrets ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb era pujada dera temperatura diürna, en toti es sectors son possibles quauqu'uns purgues de nhèu umida e fòrça umida aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son en part encara inestables sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. Per dessus des 2000 m aproximativament es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En toti es sectors per dejós des 2000 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Eth dimars serà soleienc A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.