



## Matin




## Après-midi



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
 le Mercredi 22 03 2023



Neige  
 ancienne  
 (Sous-couche  
 fragile  
 persistante)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**

**PM:**




**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
 le Mercredi 22 03 2023



Neige  
 ancienne  
 (Sous-couche  
 fragile  
 persistante)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**



Avalanches  
 mouillées  
 (Neige  
 humide)



Snowpack stability: **very poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**

**Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution. Avalanches mouillées en cours de journée.**

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées de manière très isolée par des amateurs de sports d'hiver, notamment sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes très raides exposées à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Les avalanches peuvent se déclencher dans la neige ancienne fragile et atteindre une taille moyenne.

En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente, surtout sur les pentes ensoleillées comme sur les pentes très raides exposées à l'ouest en dessous d'environ 2400 m. Les randonnées devraient être terminées à temps.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains



anguleux sont présentes, notamment sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes exposées à l'est et à l'ouest au-dessus d'environ 2400 m.

Le rayonnement nocturne est parfois réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit dès la matinée. Ces conditions météorologiques entraînent une progressive fragilisation du manteau neigeux.

## Tendance

Le rayonnement nocturne est parfois réduit. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Mercredi 22 03 2023

Avec le rayonnement solaire le danger de coulées humides et mouillées augmente un peu en cours de journée.

Les accumulations de neige soufflée déjà relativement anciennes devraient être évaluées avec prudence surtout sur les pentes raides à l'ombre en altitude.

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une humidification croissante du manteau neigeux. De rares coulées mouillées et humides en général de petite taille sont possibles dans toutes les régions.

### Manteau neigeux

Les accumulations de neige soufflée généralement petites sont partiellement encore fragiles surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Il n'y a que peu de neige.

### Tendance

Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.