




Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diuendres 08 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Eth perilh de lauegi se tròbe en rang inferior deth grad de perilh 4 (fòrt). Son possibles naui lauegi naturaus.

Eth perilh existís especiaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles naui lauegi naturaus, de manèra isolada tanben grani. Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth e arténher mides fòrça granes. Endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Especiaument desfavorables son es pales ombrères, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi. Son de besonh fòrça atencion e era màger prudència.

Enes pales escarpades, a compdar dera maitiada son probables nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion. Aço se da en cas de radiacion solara.

Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de
perilh

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb
nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de
heired

En ua zòna grana a compdar de dimars an queigut de 40 a 60 cm de nhèu, locaument mès. Es condicions meteorologiques causaràn ath long dera jornada un afebliment deth mantèth de nhèu. Era nhèu recenta e



es plaques de vent repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de gibra de superfícia. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques afavoriràn ua estabilizacion deth mantèth de nhèu. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diuendres 08 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth perilh de lauegi se tròbe en rang superior deth grad de perilh 3 (mercat). Son possibles naui lauegi naturaus.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles naui lauegi naturaus. Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth e arténher mides mejanas. Endrets perilhosos se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosos augmentaràn damb era altitud. Especialment desfavorables son es pales ombrères, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt damb facilitat desencadenar lauegi. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Enes pales escarpades, a compdar dera maitiada son probables nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion. Aço se da en cas de radiacion solara.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativamente. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de
perilh

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb
nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de
heired

En ua zòna grana a compdar de dimars an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Es condicions meteorologiques causaràn ath long dera jornada un afebliment deth mantèth de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.




En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de gibra de superfícia. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia


Es condicions meteorologiques afavoriràn ua estabilizacion deth mantèth de nhèu. Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 08 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Enes pales escarpades, a compdar dera maitiada son probables lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Açò se da enes sectors mès afectadi pes precipitacions en cas de radiacion solara.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides mejanas. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu


En ua zòna grana an queigut de 5 a 20 cm de nhèu. Era nhèu vielha ei umida. Açò se da per dejós des 2200 m aproximativament.

Tendéncia

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 08 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es lauegi pòden desencadenar-se implicant es coches superficiaus deth mantèth e arténher mides mejanas. Endrets perilhos se tròben per dessús des 2000 m aproximativament. Especialment desfavorables son es pales ombrères, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Aguestes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessús des 2000 m aproximativament. Açò se da principaument apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales escarpades, a compdar dera maitiada son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Açò se da en cas de radiacion solara.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativamente. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. En fòrça endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de gibra



de superfícia.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques afavoriràn ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.