

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDiuendres 05 04 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Naues acumulacions de nhèu ventada an d'avalorarse damb prudència en altitud. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perihosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden desencadenar era nhèu vielha fòrça umida.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana a grana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits aumentarà progressivament, sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd en altitud. Eth ligam entre es diüerses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.



Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just e s'atendirà ja ath long deth maitin. Açò se da especiaument enes pales soleienques en còtes mejanes e nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà.
Damb era pujada de temperatures, es plaques de vent s'estabilizaràn.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 05 04 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar damb atencion.

Damb era pujada des temperatures, era activitat de lauegi de nhèu umida e fòrça umida mejanes disminuirà progressivament. Açò se da especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes e per dejós des 2400 m aproximativament. Ja ath maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida isolades.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da principaument enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita se pòden desencadenar de manèra isolada sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, sustot apròp des crestes, en canaus e conques, sustot enes sectors fòrça exposadi ath vent.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb eth vent fòrt deth quadrant oèst, enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst se formaràn plaques de vent inestables. Açò se da especiaument enes pales fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atendirà ath maitin. Açò se da especiaument enes pales soleienques en còtes mejanes e nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perih de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.