

## Grad de perilh 3 - Mercat




**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**

enDimars 09 04 2024




Nhèu umida




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuèncià: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi d'esguitlament basau e de purgues fòrça umides aumentarà rapidament en totes es orientacions. En canaus inclinades es lauegi fòrça umits arribaràn de manèra isolada enquia còtes mejanes. Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn a estat redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu non s'a regelat pas e ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères encara en còtes mejanes e nautes.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau disminuirà progressivament sonque pendent era net.

## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDimars 09 04 2024



Nhèu umida




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament  
de nhèu



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi d'esguitlament basau e de purgues fòrça umides aumentarà rapidament en totes es orientacions, non sonque enes pales soleienques includint enes pales ombrères arribentes en còtes mejanes e nautes. En canaus inclinades es lauegi fòrça umits arribaràn de manèra isolada enquia còtes mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères encara en còtes mejanes e nautes.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau disminuirà progressivament sonque pendent era net.